

با روشهای درمان اعتیاد آشنا شویم

سم زدایی و پاک کردن مواد افیونی از بدن نخستین کام برای بیمارانی است که وارد برنامه های درمان و توانبخشی ترک اعتیاد میشوند. به همراه آن باید بیمار به شرکت فعال در گروههای خودیاری و درمان های غیر دارویی تشویق شود چرا که سم زدایی تنها در دراز مدت با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. سم زدایی به شیوه های ساده با داروهای مسکن و آرام بخش و نیز به اشکال پیچیده که نیاز به بستره شدن و بیهوشی دارد امکان پذیر است.

سم زدایی سرپایی
در این روش از داروهایی استفاده می شود که باعث رفع برخی از علائم ترک میشوند(مانند کلونیدین-بوپرنسوفین و ...) به همراه این داروها از داروهای ضد افسردگی داروهای ضد داروی خود را از داروهای ضد تهوع و داروهای خواب اور نیز استفاده میشود. با توجه به اینکه مصرف هر کدام از داروهای ذکر شده فواید و عوارض خاص خود را دارد نظرات حرفه ای و تخصصی در طول انجام سم زدایی ضروري است.

سم زدایی سریع:
در موارد مقاوم، در افراد جوان و در افرادی که از سایر روشهای درمانی فایده نبرده اند از این روش با کمک امکانات بیهوشی و مراقبت های ویژه و بستره شدن بیمار، سرویس های تخصصی دارویی ارائه میشود.

سم زدایی فوق سریع:
در کسانی که به سایر روشهای سم زدایی مقاوم بوده و تحمل علائم شدید ترک را نداشته و یا قادر به تکمیل کردن برنامه های ترک نبوده اند، از این روش استفاده می شود. در این روش ابتدا بیمار تحت بیهوشی سبک قرار میگیرد و در طول این مدت (۵ الی ۶ ساعت) با کمک داروهای ضد افیونی، مواد افیونی از بدن بیمار پاک شده و تنها برخی بیماران ممکن است پس از اتمام بیهوشی علائم خفیف ترک را تجربه کنند. البته در برخی دیگر تا ۷۲ ساعت کماکان احساسات درد و ناخوشی ادامه خواهد داشت. پس از سم زدایی با هر کدام از روشهای فوق برای پیشگیری از عود دو کار اصلی باید انجام گیرد:

- ۱- استفاده از داروی پیشگیری از عود (نالتروکسون)
- ۲- درمان های غیر دارویی

برای شروع داروی پیشگیری از عود (نالتروکسون) حتما دوره سم زدایی باید به اتمام رسیده باشد.

درمان های غیر دارویی

گروه درمانی

امکان صحبت در مورد مشکلات و بررسی و بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مربوط به فرایند درمان را فراهم می کند. بعضی معتقدند گروه درمانی بهترین روش برای درمان معتادان است.

خانواده درمانی

پیرامون هر فرد معتقد خانواده ای در رنج است. در درمان یا ادامه اعتیاد خانواده نقش بسزایی دارد

درمان های شناختی ، رفتاری

در این روش که بر مبنای یادگیری شکل گرفته است، بر توانایی انسان برآموختن رفتارهای سازگار و ناسازگار و چگونگی تغییر ان تاکید میشود.

روان روان پویشی

در این روش به انگیزه های فردی، ارتباطی و اجتماعی که در طی دوران رشد برای فرد حادث شده و زمینه ساز پیدایش اعتیاد شده است اشاره میشود.

گروه خودیاری معتادان گمنام (NA)

گروههایی هستند که توسط خود معتقدان به منظور حمایت از یکدیگر، گفتگو، راهنمایی و ارائه راه حل تشکیل میشود. این گروهها فاقد درمانگر بوده و خود معتقدان انها را اداره میکنند. در این گروهها بر مسئولیت خود فرد در ارتباط با اعتیاد تاکید میشود. این گروه بر اساس دوازده قدم و دوازده سنت که نماینگر قاعده و اصول این گروههاست، اداره میشود.

جامعه درمان مدار (TC)

برنامه های اقامتی طولانی مدتی هستند که ۹ تا ۱۲ ماه طول میکشند و بر مبنای خود یاری اند.

منبع :
اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد(معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی)